

### ALTERAÇÕES DO APETITE

Podem encontrar-se duas situações: o consumo de alimentos diminui ou desapareceu, ou a ave esta quase permanentemente enfrente do comedouro, escolhendo e depenicando as sementes sem as comer.

A primeira situação se bem que característica de várias doenças, caso se prolongue deve-nos levar a suspeitar da presença de uma proventriculite (recomenda-se a suplementação com [FLORABACTIL](#) )

Na segunda situação, podemos suspeitar de hepatite caso se verifiquem a existência de outros sintomas. Neste caso e na fase inicial a ave só se apresenta na posição de corpo em bola durante breves períodos de tempo, retornando de imediato a sua postura normal, quando aproximamos a mão. Com o evoluir da doença a prostração torna-se cada vez mais evidente e persiste mesmo ao aproximar da mão (recomenda-se a administração de [FLORACHOLINE](#) na posologia indicada no capítulo .

No verão com o tempo mais quente, é normal que as aves consumam menos quantidade de sementes. Esta redução do consumo leva a uma menor ingestão e absorção de substâncias indispensáveis; vitaminas, ácidos-aminados essenciais.... Justificando mais do que nunca a administração de um suplemento vitamínico como o [Alimento MULTIVITAMINADO MOUREAU com extracto de f&iacute;gado \(ex: FLORATONYL](#)

)  
numa posologia de 2 gotas por 60ml de água bebida ou 35 gotas por litro.